



FLUOQUIN

Pó solúvel

DESCRIÇÃO:

FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL é um produto antimicrobiano à base de enrofloxacin, uma quinolona carboxílica de terceira geração de ação rápida e eficaz para o tratamento de infecções dos tratos digestivo e respiratório, sistema locomotor e nervoso.

FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL caracteriza-se por ser um produto de altíssima solubilidade e, principalmente por ter um veículo inorgânico, em hipótese alguma provoca o entupimento de bebedouros e outros utensílios utilizados na avicultura. **FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL** pode ser administrado tanto via água como via ração, pois o enrofloxacin-base e seus veículos não provocam alterações na palatabilidade.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 g do produto contém:

Enrofloxacin.....	50,00 g
Excipientes q.s.p.	100,00 g

INDICAÇÕES:

FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL é indicado para o tratamento de doenças respiratórias e entéricas das aves causadas por: *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Shigella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Campilobacter spp.* e *Mycoplasma spp.*

A critério do médico veterinário, outras infecções causadas por germes sensíveis ao enrofloxacin.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

Administração via oral através da água de bebida ou via ração.

A posologia básica é de 10 mg de enrofloxacin por quilo de peso vivo por dia.

Diluir 50 g do produto em 500 litros de água para medicar 2.500 kg de peso vivo. Na ração, 50 g do produto para medicar 2.500 kg de peso vivo. Ajustar a quantidade do produto na ração de acordo com a fase de crescimento.

O produto deverá ser fornecido aos animais por 3 a 5 dias, não devendo o tratamento ser interrompido até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas. No caso de salmoneloses, o tratamento deverá ser de no mínimo 5 dias.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

8 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO:

Embalagens contendo 5 kg (fracionados em sachês de 100 g) e 20 kg do produto.

